

GLP-1 ダイエット（ビクトーザ）療法同意書

以下の内容をご了承いただけましたら、最後にご署名ください。

治療法、効果

ビクトーザは、アメリカやヨーロッパで肥満症の治療薬として承認を受けた副作用の少ない製剤で、血糖値を下げるホルモンであるインスリンの分泌を血糖値に応じて促進させ、同時に血糖値を上げるホルモンであるグルカゴンの分泌を抑制する効果があります。

その結果、食欲を抑制し体重や内臓脂肪、筋力中の脂肪を減らす効果が期待できますが、

厚労省によって認可を受けたものではなく個人差があり効果を 100%保証するものではありません。

治療が受けられないケース

- ・ 20 歳未満の方。
- ・ 妊娠やその可能性がある方。授乳中の方。
- ・ 他の GLP-1 作動薬やインスリン使用中、I 型糖尿病、重度の胃腸障害の方。
- ・ 膵炎、腸閉塞などの既往がある方。
- ・ 激しい運動やアルコール過飲、栄養不良など低血糖をおこす恐れがある場合。
- ・ その他、重病治療中など、医師が不適切と判断した場合。

副作用

- ・ 嘔気、食欲不振、便秘、下痢、倦怠感など。これらは徐々に治まることが多いですが

副作用が強い場合はご相談ください。

- ・自己注射による内出血、痛みなど。
- ・重大な副作用として低血糖、膵炎、腸閉塞などがあります。

これらの症状が現れた場合は投与を中止し、医療機関を受診してください。

(脱力感、冷汗、動悸、めまい、激しい腹痛、腹部膨満など)

治療の方法、注意など

- ・採血の結果により治療が受けられない場合があります。
- ・1日1回午前中の同じ時間(食前、食後は問わず)に毎日0.3mgを投与してください。
副作用がなく効果が不十分な場合は1週間継続した後に増量します。同様に1.8mgまで増量できますが、増量時に嘔気が続くようなら元の量に戻してください。

※容量に関しては、医師の指示に従って下さい。

- ・皮下注射は消毒後、腹部(又は大腿、上腕)に前回の注射部位より2、3cmずらして行ってください。
- ・使用開始後はキャップ等により遮光して室温(30℃以下)で保管し、30日以内に使用してください。(未使用の場合は冷蔵庫で凍結させないように保管してください。)
- ・使用後の針は医療廃棄物となります。ペットボトル等に入れて頂きクリニックにご持参下さい。
- ・決まった時間に打ち忘れた場合は、投与するべき時間から12時間未満の場合は、気づいた時にすぐ注射します。12時間以上過ぎている場合は、1回スキップして次の予定時間に1回のみ投与します。ただし、2~3日以上投与しなかった場合は、再び0.3mgから始めて下さい。(高用量で始めると吐き気などの副作用が出てしまう可能性があります。)

その他注意点など

- ・必ず指導時の用法、用量を守って治療を行ってください。
- ・効果を判定するには 3 ヶ月以上は継続が必要です。
- ・体調不良時や全く食事が摂れない状態などで使用しないでください。
- ・BMI18 以下 (160cm/46kg)、部分痩せ目的、65 才以上の方などは効果が出にくいことがあります。

料 金

- ・ビクトーザ 1 本 18mg 69,000 円 (針・アルコール綿費用込み)

※ビクトーザ 18mg2 本目以降は、56,000 円

- ・採血、尿検査代 5,500 円
- ・針の廃棄代 1,500 円

(使用した針はクリニックで廃棄しますので、ペットボトル等に入れてお持ち下さい)

- ・診察代 2,000 円 ※料金は全て税別表示

ビクトーザ 1 本の使用日数の目安

- ・1 回 0.3mg 使用で 約 50 日
- ・1 回 1.2mg 使用で 約 25 日
- ・1 回 1.8mg 使用で 約 7 日

※ビクトーザ、針、アルコール綿はいかなる場合におきましても、返品・返金はできませんのでご了承ください。

私は、上記記載の事項について了承し、自己責任の上で自由診療を行います。

日付 年 月 日

氏 名 : _____ 生年月日 年 月 日

ご住所 〒 _____

連絡先: _____